

# **ANALISIS KARAKTERISTIK SIFAT KIMIA TANAH PADA LAHAN ORIGINAL PRA TAMBANG DAN LAHAN REVEGETASI PASCA TAMBANG BATU BARA DI PT TRUBAINDO COAL MINING KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

*By irfan Efendi*

## ANALISIS KARAKTERISTIK SIFAT KIMIA TANAH PADA LAHAN ORIGINAL PRA TAMBANG<sup>36</sup> DAN LAHAN REVEGETASI PASCA TAMBANG BATU BARA DI PT TRUBAINDO COAL MINING KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Irfan Efendi<sup>1</sup>, Kholik Hidayah<sup>2</sup>, Zuhdi Yahya<sup>2</sup> dan Legowo Kamarubayana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.

E-Mail: irfan@untag-smd.ac.id

### ABSTRAK

**Analisis Karakteristik Sifat Kimia Tanah Pada Lahan Pra dan Pasca Tambang<sup>35</sup> Batubara di PT Trubaindo Coal Mining, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.** Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui karakteristik sifat kimia tanah pada lahan original pra tambang dan pada lahan revegetasi pasca tambang yang mengalami ketidaknormalan pertumbuhan tanaman dan yang pertumbuhannya normal. Metode penelitian menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan umur pengolahan lahan revegetasi pasca tambang dengan jenis tanaman Jabon (*Anthocephalus cadamba*). Pengambilan sampel tanah mengikuti metode standar Food and Agriculture Organization (FAO 1976) yaitu pada kedalaman 0-30 dan 0-60 cm pada setiap titik pengamatan, selanjutnya dianalisis sifat kimia tanahnya dan akan dibandingkan. Analisis sifat kimia tanah dilakukan di Laboratorium Tanah Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida (PUSREHUT), Fakultas Kehutanan, Universitas 45 lawarman Samarinda.

Berdasarkan hasil analisis sifat kimia tanah pada lahan original pra tambang dilokasi penelitian pada umumnya mempunyai nilai pH yang sangat rendah berkisar antara (4,12-10,1 H<sub>2</sub>O), C-organik sedang hingga sangat rendah berkisar antara (2,42-0,22 %), nitrogen rendah hingga sangat rendah berkisar antara (0,18-0,05 %), fosfor sangat rendah berkisar antara (4,27-0,22 ppm), kalium rendah hingga sangat rendah berkisar antara (0,15-0,10 meq/100 gr), natrium sangat rendah berkisar antara (0,02-0,01 meq/100 gr), magnesium rendah hingga sangat rendah berkisar antara (0,25-0,03 meq/100 gr), kalsium sangat rendah berkisar antara (0,14-0,04 meq/100 gr), kapasitas tukar kation sangat rendah berkisar antara (9,96-3,04 meq/100 gr), kejenuhan basa sangat rendah berkisar antara (8,11-2,08 %) dan kejenuhan aluminium yang tinggi hingga sangat tinggi berkisar antara (56,49-72,26 %).

Adapun sifat kimia tanah pada lahan revegetasi pasca tambang dilokasi penelitian baik pada tanaman yang mengalami ketidaknormalan pertumbuhan dan yang pertumbuhannya normal tidak memiliki perbedaan yang signifikan kecuali magnesium yang mempunyai nilai tergolong sedang dan kejenuhan basa mempunyai nilai yang tergolong tinggi pada tanaman yang pertumbuhannya normal, berikut rinciannya nilai pH berkisar antara (4,09-4,53 H<sub>2</sub>O), C-organik berkisar antara (0,44-1,27 %), nitrogen berkisar antara (0,08-0,10 %), fosfor berkisar antara (0,22-2,50 ppm), kalium berkisar antara (0,11-0,15 meq/100 gr), natrium berkisar antara (0,00-0,02 meq/100 gr), magnesium berkisar antara (0,15-1,89 meq/100 gr), kalsium berkisar antara (0,05-1,29 meq/100 gr), KTK berkisar antara (4,50-6,12 meq/100 gr), dan kejenuhan aluminium berkisar antara (23,76-76,83).

**Kata kunci :** Pertambangan Terbuka, Revegetasi, Analisis, Sifat Kimia Tanah.

### 1. PENDAHULUAN

Penambangan batu bara dengan metode penambangan terbuka menyebabkan degradasi lahan, dengan terjadinya kerusakan sifat fisika, kimia dan biologi tanahnya, untuk itu

diperlukan suatu upaya agar tanah tidak semakin terdegradasi, dengan cara kegiatan revegetasi yang merupakan salah satu teknologi rehabilitasi lahan rusak yang diakibatkan aktivitas manusia. Tujuan utama rehabilitasi lahan bekas

tambang melalui revegetasi adalah menciptakan percepatan sukses penutupan lahan oleh vegetasi yang mapan, efek katalis revegetasi ini diharapkan melalui perubahan kondisi di bawah tajuk (meningkatnya lengas tanah, mengurangi temperatur, dan lain-lain, meningkatkan struktur vegetasi menuju tingkat klimak, dan menghasilkan lapisan seresah organik dan humus pada tahun-tahun awal pertumbuhan tanaman), revegetasi akan meningkatkan kecepatan perkembangan keragaman genetik dan biokimia pada lahan terdegradasi, kondisi tanah yang merupakan perpaduan sifat-sifat fisika, kimia dan biologi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan revegetasi lahan pasca penambangan, sedangkan fungsi tanah sendiri adalah sebagai reaktor lingkungan dan media tumbuh tanaman.

Evaluasi kegiatan diperlukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan revegetasi yang telah berjalan dalam upaya merehabilitasi dan memulihkan lahan yang rusak, hasil pelaksanaan evaluasi diperlukan untuk memberi rekomendasi dan bahan masukan guna perbaikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan pada masa yang akan datang, evaluasi kegiatan dapat dilakukan dengan cara melihat keberhasilan tumbuh tanaman (persentase tumbuh) dan kesehatan tanaman (persentase sehat) Permenhut (2009), selain itu dapat juga melakukan pendekatan melalui penilaian sumberdaya tanah, pendekatan penilaian sumberdaya tanah telah banyak mengalami perkembangan dengan melibatkan berbagai fungsi tanah secara holistik, tidak hanya aspek produktivitas lahan saja, untuk itu kegiatan penilaian memerlukan tolok ukur yang dapat menggambarkan kecenderungan umum perubahan kondisi tanah selama dimanfaatkan, salah satu tolok ukur penilaian tersebut adalah mengetahui sifat kimia tanahnya.

Evaluasi mengenai sifat kimia tanah merupakan proses pendiagnosaan masalah keharaan dalam tanah serta menentukan jenis dan jumlah unsur hara yang diperlukan, salah satu cara yang sering digunakan dalam menilai sifat kimia tanah adalah melalui pendekatan dengan analisis tanah atau uji sampel tanah, secara umum uji tanah adalah suatu kegiatan analisis kimia di laboratorium yang sederhana, cepat, murah, tepat, dan dapat diulang (reproduceable) untuk menduga ketersediaan unsur hara, uji tanah dalam arti luas yaitu menyangkut aspek-aspek interpretasi, evaluasi dan penyusunan rekomendasi pupuk dari hasil uji tanah serta pengambilan sampel tanah. Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui karakteristik sifat kimia tanah pada lahan original pra tambang dan pada lahan revegetasi pasca tambang yang mengalami ketidaknormalan pertumbuhan tanaman dan yang pertumbuhannya normal.

34

## 2. METODA PENELITIAN

### 2.1. Tempat dan Waktu

Pengambilan data penelitian dilakukan di areal lahan revegetasi pasca tambang batubara PT Trubaindo Coal Mining di Blok 05 Ex Pit 3000, Blok 03 Ex Pit 6800 dan Blok 12 Ex Pit 4500 serta lahan original pra tambang di Blok 33, Blok 05, Blok 03, Blok 14 Pit 3000, Blok 14 Pit 7000, Blok 18 dan Blok 35. Pada bulan Juli-September 2018.

41

### 2.2. Bahan dan Alat

Bahan penelitian ini adalah contoh tanah lahan revegetasi pasca tambang batu bara PT Trubaindo Coal Mining yang berumur 2 tahun di Blok 05 Ex Pit 3000 dan umur > 3 tahun di Blok 03 Ex Pit 6800 dan Blok 12 Ex Pit 4500 serta lahan original pra tambang di Blok 33, Blok 05, Blok 03, Blok 14

Pit 3000,Blok 14 Pit 7000, Blok 18 dan Blok 35.


Alat yang digunakan dalam pengambilan data, antara lain peta lokasi, LV strada untuk transportasi, GPS, software (autocad dan ms-office), kompas, laptop, cangkul, sekop, p<sub>39</sub>ng, plastik sampel, label, meteran, alat tulis dan kamera.

### 2.3. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan umur pengolahan lahan revegetasi pasca tambang

meliputi lahan revegetasi pada umur 2 tahun di Blok 05 umur > 3 tahun di Blok 03 dan 12 dengan jenis tanaman Jabon (*Anthocephalus cadamba*) adapun pada lahan original pra tambang selain diambil ada blok yang sama dengan lahan revegetasi diambil juga pada blok-blok yang sudah ditentukan.

Metode pengambilan sampel tanah mengikuti metode standar Food and Agriculture Organization (FAO 1976) yaitu pada kedalaman 0-30 dan 30-60 cm pada setiap titik pengambilan contoh tanah.



Gambar 1. Metode Pengambilan Contoh Tanah

29

Analisis sifat kimia tanah dilakukan di Laboratorium Tanah Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida (PUSREHUT), Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman Samarinda, dan kriteria penilaian sifat kimia tanah menggunakan Petunjuk Teknis Evaluasi Kesuburan Tanah dari Balitanah Bogor (2005).

### 2.4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan pra lapangan, tahapan lapangan, tahapan

pasca lapangan dan tahapan penyusunan laporan berikut penjelasanya :

#### 2.4.1. Tahapan Pra-Lapangan

Pada tahapan ini yang dilakukan pertama adalah penyusunan proposal penelitian, Perijinan dan kelengkapan administrasi lainnya. Kedua kajian pustaka, kegiatan ini merupakan tahapan awal yang berguna untuk mengetahui peneliti-peneliti terdahulu mengenai kegiatan reklamasi pasca tambang batubara, ini berguna sebagai referensi dilakukannya penelitian, sehingga sebelum dilakukan pendataan di lapangan, peneliti mampu menginterpretasikan

terlebih dahulu sebelum ke lapangan. Adapun interpretasi awal pada tahapan ini berdasarkan kajian pustaka adalah bahwa salah satu penyebab utama tanaman revegetasi pada lahan pasca tambang yang mengalami ketidaknormalan pertumbuhan disebabkan oleh media tumbuhnya yaitu tanahnya yang mengalami degradasi, dimana tanah yang terdegradasi menunjukkan penurunan atau memburuknya sifat-sifat tanah pada suatu lahan, baik sifat-sifat fisik, kimia maupun biologi.

#### 2.4.2. Tahapan Lapangan

Pada tahapan ini merupakan realisasi dari interpretasi tahapan pralapangan. Berdasarkan interpretasi awal tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah observasi lapangan, kedua penentuan lokasi penelitian dan ketiga metode pengambilan sampel tanah, berikut penjelasanya :

##### a. Observasi lapangan

Observasi lapangan merupakan peninjauan untuk mengenali medan dan kondisi lapangan dan pengamatan langsung kelapangan terhadap objek pengamatan, adapun objek pengamatan spesifik dilakukan kepada lahan-lahan rehabilitasi yang terdapat tanaman revegetasi yang mengalami ketidaknormalan pertumbuhan, dikarenakan tanaman yang mengalami ketidaknormalan pertumbuhan terindikasi media tumbuhnya yaitu berupa tanah yang terdegradasi.

##### b. Penentuan lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, berdasarkan hasil diskusi dengan manajemen perusahaan penelitian diarahkan pada Blok-Blok selatan dari konsesi IUP PT Trubaindo Coal Mining yaitu di lahan revegetasi pasca tambang di Blok 05 Ex Pit 3000, Blok 03 Ex Pit 6800 dan Blok 12 Ex Pit 4500 serta lahan original pra tambang di Blok 33, Blok 05,

Blok 03, Blok 14 Pit 3000, Blok 14 Pit 7000, E<sub>52</sub>k 18 dan Blok 35.

##### c. Metode pengambilan sampel tanah

Metode pengambilan sampel tanah merupakan unsur utama dalam penelitian ini, yang dituntut untuk keakuratan data baik secara kualitatif maupun kuantitatif, karena keakuratan data yang diambil akan mempengaruhi hasil akhir penelitian ini, Berikut penjelasan proses metode pengambilan sampel tanah tersebut :

Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan umur pengolahan lahan revegetasi pasca tambang dan metode komposit, mengambil sampel tanah sebanyak 1 kg dari kedalaman interval (0-30) cm dan (30-60) cm pada masing-masing Blok penelitian, pengambilan sampel mengikuti metode standar Food and Agriculture Organization (FAO 1976). Intensitas pengambilan sampel terkait dengan jumlah titik pengambilan sampel untuk penelitian awal ini menyesuaikan dengan kesepakatan manajemen perusahaan yaitu mengambil satu titik pengambilan sampel pada setiap Blok yang telah ditentukan. Untuk lahan original pra tambang dipilih lokasi yang masih original yang dipastikan belum terganggu dari kegiatan pertambangan dan masyarakat sekitar.

Untuk lahan revegetasi pasca tambang dipilih lahan yang tanaman revegetasinya mengalami ketidaknormalan pertumbuhan misalnya tanaman kerdil, rimpang tinggi dan diameter tidak sesuai umurnya, daun berwarna kuning, rotok dan tanaman banyak yang mengalami kematian. Kegiatan pengambilan sampel tanah dimulai dengan membersihkan permukaan dan sekitar tempat pengambilan sampel tanah seperti sisa kotoran daun dan semak. Kemudian tanah digali dengan cangkul membuat lubang kurang lebih lebar 40 cm dan dalam 60 cm sehingga membentuk

suatu profil tanah berbentuk vertikal, setelah itu diukur menggunakan meteran dan diberi tanda untuk batas interval pengambilan sampel yang ditentukan, setelah itu sampel tanah diambil menggunakan cangkul dan sekop, selanjutnya sampel tanah dimasukan kedalam kantong plastik, diikat dan diberi lebel, kemudian mengambi gambar sebagai dokumentasi, ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis untuk menunjukan kepada pembaca, agar dapat melihat kenampakan-kenampakan fisik dari profil tanah yang dibuat pada penelitian ini, merekam atau recording titik penelitian menggunakan GPS, untuk memudahkan agar ketika diperlukan kembali titik penelitian mudah dicari, terakhir sampel dikirim untuk dianalisis ke Laboratorium Ilmu Tanah Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas Mulawarman Samarinda.

49

#### 2.4.3. Tahapan Pasca-Lapangan


Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengabungkan data dari kajian pustaka dan dari data penelitian yang didukung dari hasil

analisis Laboratorium, dan ditetapkan kriteria penilaian sifat kimia tanahnya menggunakan Petunjuk Teknis Evaluasi Kesuburan Tanah dari Balitanah Bogor (2005).

### 46 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Lokasi PT Trubaindo Coal Mining

Lokasi Penelitian secara administratif berada pada daerah <sup>24</sup>camatan Muara Lawa dan Betian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Secara koordinat geografis terletak pada 115°30'00" - 155°51'30" BT, 0°27'44" - 0°51'41" LS. PT Trubaindo Coal Mining memiliki perjanjian kontrak karya dengan pemerintah Indonesia, konsesi tambang batubara seluas kurang lebih 23,000 ha. Untuk mencapai lokasi penelitian tersebut dari Kota Samarinda menuju kantor PT TCM site Adong, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dapat menempuh perjalanan darat menggunakan roda empat kurang lebih 8 jam.



Gambar 1. Lokasi Kesampean Daerah Penelitian, Tanpa Skala. Sumber : Peta Konsesi PT TCM BEK, Website:itmg.co.id

#### 3.2. Iklim dan Curah Hujan

Berdasarkan data iklim daerah kabupaten kutai barat yang bersumber dari Dinas pangan, tanaman pangan dan horikulutra karakteristik iklim Kabupaten Kutai barat termasuk dalam kategori iklim tropika humida, dengan rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan April dan terendah di bulan Agustus serta tidak menunjukkan adanya bulan kering atau sepanjang bulan dalam satu tahun selalu terdapat sekurang-kurangnya tujuh hari hujan.

### 16 3.3. Fisiografi

Fisiografi Kutai Barat dapat dikelompokan menjadi delapan yaitu: Alluvial Jalur Kelokan, Rawa-rawa, Lembah, Teras-teras, Dataran, Perbukitan dan Pegunungan, Bentuk lahan dominan adalah daerah dataran (38%), perbukitan (22%) dan pegunungan (32%).

### 3.4. Kondisi Geologi

Secara geologi Kabupaten Kutai Barat terbagi dalam 14 formasi yaitu: formasi Haloq-Batu Kelau, Ujoh Bilang, Balikpapan, batu Ayau, Golok, Haloq, Kampung Baru, Kelinjau, Kuaro, Meragoh/ Meliat, Pemaluan, Pulau Barang, Tanjung dan Tuyudan, Beragam formasi ini terbentang beragam di sepanjang Kutai Barat, Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geologi di daerah ini relatif beragam yang menandakan perbedaan jenis batuan penyusunnya serta morfologi wilayahnya.

### 5 Jenis Tanah

Jenis-jenis tanah yang terdapat di **Kabupaten** Kutai Barat menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah : Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptisol dan Mollisol, atau bila menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah Podsolik, Alluvial, Andosol dan Renzina, Adapun pada wilayah penelitian tergolong kedalam jenis tanah Ultiol.

### Sifat Kimia Tanah Berdasarkan Jenis Tanah 6 Pada Wilayah Penelitian

Menurut Hardjowigeno (2003), Ultisol mempunyai sifat kimia yang kurang baik yang dicirikan oleh kemasaman tanah yang tinggi dengan pH < 5, kandungan bahan organik tanah rendah sampai sedang, kandungan hara N, P, K, Ca, Mg dan Mo rendah, Kapasitas tukar kation (KTK) kecil dari 24 me/100 g, Sebaliknya kelarutan Al, Mn, dan Fe sering tinggi, sehingga sering meracun bagi tanaman, hal itu disebabkan oleh tingkat pelapukan yang sudah lanjut serta curah hujan yang tinggi, sehingga unsur hara tercuci ke lapisan bawah.

### Kemasaman Tanah (pH) dan Kejenuhan Aluminium

Pengolahan dari data Kemasaman Tanah (pH) dan Kejenuhan Aluminium yang telah dida<sup>44</sup>kan dilapangan menghasilkan nilai seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Nilai Kemasaman Tanah (pH) dan Kejenuhan Aluminium Antara Lahan Original

No	Lapangan		pH H <sub>2</sub> O	Kejenuhan AI %
	Kode	Interval (cm)		
1	BL33SB2 (OR P.3000)	0-30	3.93 (SM)	63.68 (ST)
		30-60	3.92 (SM)	70.48 (ST)
3	BLO5SB1 (OR P.3000)	0-30	3.71 (SM)	59.15 (T)
		30-60	3.74 (SM)	66.95 (ST)
5	BLO3SB1 (OR P.6800)	0-30	3.74 (SM)	62.97 (ST)
		30-60	3.83 (SM)	65.50 (ST)
7	BL14SB2 (OR P.7000)	0-30	3.76 (SM)	74.16 (ST)
		30-60	3.92 (SM)	72.81 (ST)
9	BL14SB2 (OR P.3000)	0-30	3.77 (SM)	56.59 (T)
		30-60	4.12 (SM)	62.89 (ST)
11	BL18SB2 (OR)	0-30	3.93 (SM)	61.47 (ST)
		30-60	3.83 (SM)	60.25 (T)
13	BL35SB2 (OR)	0-30	3.80 (SM)	60.20 (T)
		30-60	3.89 (SM)	72.26 (ST)

Keterangan : OR (Lahan Original Pra tambang), SM (Sangat Masam), T (Tinggi), ST (Sangat Tinggi)

Tabel 2. Perbandingan Nilai Kemasaman Tanah (pH), Kejenuhan Aluminium, Tinggi dan Diameter Antara Lahan Revegetasi

No	Lapangan		pH H <sub>2</sub> O	Kejenuhan AI %	Tinggi m	Diameter cm	Keterangan Pertumbuhan
	Kode	Interval (cm)					
1	BLO5SB1 (PT P.3000)	0-30	4.23 (SM)	61.05 (ST)			Tidak Normal
		30-60	4.09 (SM)	76.83 (ST)			
3	BLO3SB1 (PT P.6800)	0-30	4.12 (SM)	57.23 (T)	2.70	4.77	Tidak Normal
		30-60	4.18 (SM)	62.43 (ST)			
5	BL12SB1 (PT P.4500)	0-30	4.53 (M)	56.68 (T)	13.56	22.29	Normal
		30-60	4.45 (M)	23.76 (S)			

Keterangan : PT (Lahan Revegetasi Pasca Tambang) M (Masam), SM (Sangat Masam), S (Sedang), T (Tinggi), ST (Sangat Tinggi)

38

Berdasarkan hasil analisis sampel tanah di Laboratorium Tanah Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Hutan Universitas Mulawarman Samarinda, baik pada kedalaman 0-30 maupun 30-60 cm menurut Petunjuk Teknis Evaluasi Kesuburan Tanah dari Balitanah Bogor (2005) nilai pH pada lahan original pra tambang kesluruhan tergolong sangat masam dengan nilai (3,71-4,12) dan nilai kejenuhan aluminium tergolong tinggi sampai sangat tinggi dengan nilai berkisar antara (59.15-74.16 %), perbandingan nilai kemasaman tanah (pH) dan kejenuhan aluminium antara lahan original pra tambang dapat dilihat pada tabel 2.

Adapun pada lahan revegetasi pasca tambang nilai pH pada lahan revegetasi pasca tambang Blok 03 dengan umur tanaman > 3 tahun dan Blok 05 dengan umur 2 tahun yang mengalami tidaknormal pertumbuhan tanaman, baik pada kedalaman 0-30 maupun 30-60 cm menurut Petunjuk Teknis Evaluasi

Kesuburan Tanah dari Balitanah Bogor (2005) tergolong sangat masam yaitu dengan nilai pH (4,09-4,23). Sedangkan pada Blok 12 dengan pertumbuhan tanaman yang normal dan dengan umur tanaman > 3 tahun yaitu tergolong masam dengan nilai pH (4,45-4,53), meski berbeda golongan dan mempunyai umur tanaman yang sama nilai pH pada blok 03 dan blok 12 diatas tidaklah jauh berbeda hanya berkisar antara (4,12-4,53).

Adapun kejenuhan aluminium pada lahan revegetasi pasca tambang tergolong tinggi sampai sangat tinggi, yaitu berkisar antara (56.68-76.83 %), kecuali pada blok 12 yang tergolong sedang dengan nilai (23.76 %) pada kedalaman 30-60 cm. Akan tetapi menurut peneliti nilai yang tergolong sedang tersebut bukanlah penyebab tanaman jenis Jabon (*Anthocephalus cadamba*) dapat bertahan hidup selain masih tegolong sedang yang menurut Balitanah Bogor (2005) belum termasuk kondisi terbaik untuk tanaman, yang justru kondisi terbik berada pada

golongan rendah sampai sangat rendah yaitu dengan nilai (20-5 %) dan juga jika dilihat dari data hasil analisis sampel tanah pada lahan original pra tambang karakteristik sifat kimia tanah keseluruhan untuk kejemuhan aluminium semuanya tergolong tinggi sampai sangat tinggi yang mana tanaman jenis Jabon (*Anthocephalus cadamba*) mampu bertahan hidup dan berkebang biak, ini menunjukan tanaman jenis Jabon (*Anthocephalus cadamba*) toleran terhadap karakteristik sifat kimia tanah yang ekstrem seperti yang sudah dijelaskan diatas, perbandingan nilai kemasaman tanah (pH) dan kejemuhan aluminium antara lahan revegetasi pasca tamba<sup>5</sup>.

Kemasaman tanah adalah besarnya kandungan ion  $H^+$  yang terdapat di dalam tanah, reaksi tanah yang masam disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan basa-basa mudah tercuci, di samping itu hasil dekomposisi mineral aluminium silikat akan membebaskan ion aluminium, ion tersebut dapat diserap oleh koloid tanah, dan bila dihidrolisis akan menyumbangkan ion  $H^+$ , akibatnya tanah menjadi masam, <sup>5</sup>lain itu, penyebab lainnya adalah proses pelapukan bahan organik yang menghasilkan asam organik dan anorganik turut menyumbangkan reaksi asam pada tanah.

Aldd adalah kadar Aluminium dalam tanah, Al dalam bentuk dapat ditukarkan (Al-dd) umumnya terdapat pada tanah-tanah yang bersifat masam dengan pH < 5,0 Aluminium ini sangat aktif karena berbentuk  $Al^{3+}$  yang sangat merugikan dengan meracuni tanaman atau mengikat fosfor, oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pengaruh Al ini perlu ditetapkan kejemuannya, semakin tinggi kejemuhan aluminium, akan semakin besar bahaya meracun terhadap tanaman, kandungan alumunium dapat tukar ( $Al^{3+}$ ) mempengaruhi jumlah bahan kapur yang diperlukan untuk

meningkatkan kemasaman tanah dan produktivitas tanah (Anonymous, 2009), kadar aluminium sangat berhubungan dengan pH tanah, Semakin rendah pH tanah, maka semakin tinggi aluminium yang dapat dipertukarkan dan sebaliknya. Bila kejemuhan aluminium > 60%, tanah tersebut sering dikatakan tidak layak untuk tanah pertanian sebelum direklamasi atau ameliorasi terlebih dahulu, Oleh karena kejemuhan aluminium dipengaruhi oleh KTK dan juga dipengaruhi oleh tekstur, maka semakin kasar tekstur tingkat kebahayaan aluminium semakin tinggi (Rosmarkam dan Yuwono, 2002), Hakim, dkk (1986) menyatakan bahwa keracunan aluminium menghambat perpanjangan dan pertumbuhan akar primer, serta menghalangi pembentukan akar lateral dan bulu akar, apabila pertumbuhan akar terganggu, serapan hara dan pembentukan senyawa organik tersebut akan terganggu, sistem perakaran yang terganggu akan mengakibatkan tidak <sup>3</sup>isiennya akar menyerap unsur hara. Hasil Penelitian analisa tanah di Desa Giri Agung KTK kebanyakan rendah, dan masam adapun KTK yang rendah dapat ditingkatkan dengan penggunaan pupuk organik yang berguna untuk meningkatkan tanah menjadi gembur dan daya jerap tanah dan untuk meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga dapat menampung apabila dilakukan penambahan unsur hara baik secara alami maupun dengan penambahan pupuk (Datu BP et al. 2013). Selanjutnya pemupukan ditentukan oleh keadaan tanah seperti Tanah-tanah pada lokasi studi menunjukkan reaksi tanah agak masam perlu dilakukan pemberian kapur (I Gede EB et al.2017).

17

C-organik, N-total dan P-terse<sup>17</sup>

Pengolahan dari data C-organik, N-total dan P-terse<sup>17</sup>edia yang telah <sup>23</sup>apatkan dilapangan menghasilkan nilai seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Nilai C-organik, N-total dan P-tersedia Antara Lahan Original

No	Lapangan		C-organik %	N-total	P205 Bray 1 ppm
	Kode	Interval (cm)			
1	BL33SB2 (OR P.3000)	0-30	1.14 (R)	0.09 (SR)	1.86 (SR)
2		30-60	0.22 (SR)	0.13 (R)	0.22 (SR)
3	BL05SB1 (OR P.3000)	0-30	2.42 (S)	0.18 (R)	1.86 (SR)
4		30-60	1.77 (R)	0.15 (R)	1.36 (SR)
5	BL03SB1 (OR P.6800)	0-30	2.16 (S)	0.11 (R)	1.86 (SR)
6		30-60	0.90 (SR)	0.11 (R)	1.86 (SR)
7	BL14SB2 (OR P.7000)	0-30	0.90 (SR)	0.11 (R)	1.36 (SR)
8		30-60	0.79 (SR)	0.15 (R)	2.50 (SR)
9	BL14SB2 (OR P.3000)	0-30	1.51 (R)	0.10 (R)	4.27 (SR)
10		30-60	1.27 (R)	0.05 (SR)	0.72 (SR)
11	BL18SB2 (OR)	0-30	0.90 (SR)	0.11 (R)	2.50 (SR)
12		30-60	1.27 (R)	0.11 (R)	4.27 (SR)
13	BL35SB2 (OR)	0-30	1.38 (R)	0.07 (SR)	1.36 (SR)
14		30-60	0.33 (SR)	0.10 (R)	0.72 (SR)

Keterangan : OR (Lahan Original Pra tambang), S (Sedang), R (Rendah), SR (Sangat Rendah)

Tabel 4. Perbandingan Nilai C-organik, N-total, P-tersedia, Tinggi dan Diameter Antara Lahan Revegetasi

No	Lapangan		C-organik %	N-total	P205 Bray 1 ppm	Tinggi	Diameter	Keterangan Pertumbuhan	
	Kode	Interval (cm)							
		%	ppm	m	cm	cm			
1	BL05SB1 (PT P.3000)	0-30	0.44 (SR)	0.08 (SR)	1.86 (SR)			Tidak Normal	
2		30-60	1.27 (R)	0.10 (R)	0.22 (SR)				
3	BL03SB1 (PT P.6800)	0-30	0.44 (SR)	0.10 (R)	2.50 (SR)	2.70	4.77	Tidak Normal	
4		30-60	0.90 (R)	0.10 (R)	1.86 (SR)				
5	BL12SB1 (PT P.4500)	0-30	0.52 (SR)	0.06 (SR)	1.90 (SR)	13.56	22.29	Normal	
6		30-60	0.76 (SR)	0.08 (SR)	2.40 (SR)				

Keterangan : PT (Lahan Revegetasi Pasca Tambang), R (Rendah), SR (Sangat Rendah)

Berdasarkan hasil analisis sampel tanah di Laboratorium Tanah Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Unmul Samarinda seperti yang disajikan pada tabel 4 dan 5 nilai C-organik, N-total pada lahan original pra tambang <sup>9</sup> dan lahan revegetasi pasca tambang <sup>baik</sup> pada kedalaman 0-30 maupun 30-60 cm menurut Petunjuk Teknis Evaluasi Kesuburan Tanah dari Balitanah Bogor (2005) <sup>53</sup> golong rendah sampai sangat rendah, C-organik (1.77-0.33 %) dan N-total (0.18-0.05 %) kecuali pada lahan

original di Blok 05 dan 03 tergolong sedang, Sedangkan P-tersedia pada lahan original pra tambang <sup>26</sup> dan lahan revegetasi pasca tambang baik pada kedalaman 0-30 maupun 30-60 cm keseluruhan tergolong sangat rendah (4,27-0,22 %) ini diakibatkan oleh sangat tingginya kejenuhan aluminium yang dapat mengikat fosfor. Berdasarkan dari data yang telah didapatkan menurut peneliti jenis tanamn Jabon (*Anthocephala cadamba*) juga toleran terhadap C-organik, N-total dan P-tersedia yang

menpunyai nilai ekstrim yang dibuktikan normalnya pertumbuhan tanaman pada lahan revegetasi pasca tambang blok 12 dan pada lahan original pra tambang, adapun pada blok 05 khususnya blok 03 yang pertumbuhannya tidak normal diindikasikan ada faktor lain selain sifat kimia <sup>14</sup> nahnya.

C-organik secara kimiawi merupakan bagian yang mudah terurai melalui proses mineralisasi dan akan menyumbangkan sejumlah ion-ion hara ke dalam tanah (Hanafiah 2005), N-total jika sangat rendah akan menyebabkan tanaman kerdiril, pertumbuhan tidak normal <sup>37</sup> warna daun kekuning-kuningan, daun mati, buah tidak sempurna cepat masak dan <sup>51</sup> dar protein menjadi rendah, P-tersedia merupakan unsur hara primer yang dibutuhkan oleh tanaman, fungsi yang paling penting adalah

keterlibatannya dalam penyimpanan dan transfer energi di dalam tanaman, kekahatan P akan menghambat proses-proses seperti pembelahan sel, pengembangan sel, respirasi dan fotosintesis, tanaman yang kekurangan P <sup>43</sup> menunjukkan gejala seperti pertumbuhan terhambat kerdiril dan daun-daun menjadi ungu atau coklat dimulai dari ujung daun, gejala kekurangan P akantampak jelas pada tanaman yang masih muda.

<sup>19</sup>

Basa-Basa Dapat Ditukar ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ), KTK dan Kejenuhan Basa

<sup>19</sup> Pengolahan dari data Basa-Basa Dapat Ditukar ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ), KTK dan Kejenuhan Basa yang telah <sup>23</sup> apatkan dilapangan menghasilkan nilai seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

<sup>19</sup>

Tabel 5. Perbandingan Nilai  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ , KTK dan Kejenuhan Basa Antara Lahan Original

No	Lapangan		Kation Basa (NH <sub>4</sub> O-Ac) pH.7				KTK	Kejenuhan Basa
	Kode	Interval (cm)	K+	Na+	Mg++	Ca++		
1	BL33SB2 (OR P.3000)	0-30	0.10 (8)	0.01 (SR)	0.14 (SR)	0.06 (SR)	4.97 (SR)	6.16 (SR)
2		30-60	0.08 (SR)	0.01 (SR)	0.04 (SR)	0.04 (SR)	5.91 (R)	2.73 (SR)
3	BLO5SB1 (OR P.3000)	0-30	0.16 (R)	0.01 (SR)	0.25 (SR)	0.14 (SR)	8.73 (R)	6.51 (SR)
4		30-60	0.15 (R)	0.01 (SR)	0.12 (SR)	0.05 (SR)	9.58 (R)	3.49 (SR)
5	BLO3SB1 (OR P.6800)	0-30	0.12 (R)	0.01 (SR)	0.06 (SR)	0.05 (SR)	6.75 (R)	3.69 (SR)
6		30-60	0.13 (R)	0.01 (SR)	0.05 (SR)	0.07 (SR)	7.76 (R)	3.36 (SR)
7	BL14SB2 (OR P.7000)	0-30	0.10 (R)	0.01 (8)	0.06 (SR)	0.06 (SR)	8.32 (R)	2.80 (SR)
8		30-60	0.13 (8)	0.01 (SR)	0.03 (SR)	0.04 (SR)	9.96 (R)	2.08 (SR)
9	BL14SB2 (OR P.3000)	0-30	0.08 (8)	0.01 (SR)	0.09 (SR)	0.06 (SR)	4.57 (SR)	5.08 (SR)
10		30-60	0.07 (8)	0.01 (SR)	0.03 (SR)	0.04 (SR)	3.31 (SR)	4.41 (SR)
11	BL18SB2 (OR)	0-30	0.07 (8)	0.01 (SR)	0.04 (SR)	0.07 (SR)	3.52 (SR)	5.42 (SR)
12		30-60	0.07 (SR)	0.01 (SR)	0.06 (SR)	0.07 (SR)	3.04 (SR)	6.89 (SR)
13	BL35SB2 (OR)	0-30	0.11 (R)	0.02 (SR)	0.10 (SR)	0.20 (SR)	5.26 (R)	8.11 (SR)
14		30-60	0.12 (R)	0.01 (SR)	0.07 (SR)	0.10 (SR)	5.88 (R)	5.07 (SR)

Keterangan : PT (Lahan Revegetasi Pasca Tambang) R (Rendah), SR (Sangat Rendah)

Tabel 6. Perbandingan Nilai  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ , KTK, Kejenuhan Basa, Tinggi dan Diameter Antara Lahan Revegetasi

No	Lapangan		Kation Basa (NH <sub>4</sub> O-Ac) pH.7				KTK	Kejenuhan Basa	Tinggi	Diameter	Keterangan Pertumbuhan
	Kode	Interval (cm)	K+	Na <sup>+</sup>	Mg <sup>++</sup>	Ca <sup>++</sup>					
			meq/100 gr								
1	BL05SB1 (PTP.3000)	0-30	0.15 (R)	0.01 (SR)	0.19 (SR)	0.15 (SR)	4.50 (SR)	11.19 (SR)			Tidak Normal
		30-60	0.12 (R)	0.01 (SR)	0.15 (SR)	0.05 (SR)	5.42 (R)	6.27 (SR)			
3	BL03SB1 (PTP.6800)	0-30	0.13 (R)	0.01 (SR)	0.45 (R)	0.27 (SR)	6.12 (R)	14.15 (SR)			Tidak Normal
		30-60	0.11 (R)	0.01 (SR)	0.41 (R)	0.26 (SR)	5.87 (R)	22.06 (R)	2.70	4.77	
5	BL12SB1 (PTP.4500)	0-30	42 (R)	0.00 (SR)	0.85 (R)	0.32 (SR)	5.88 (SR)	13.45 (SR)			Normal
		30-60	0.14 (R)	0.02 (R)	1.89 (S)	1.29 (T)	5.26 (SR)	63.57 (T)	13.56	22.29	

48

Keterangan : PT (Lahan Revegetasi Pasca Tambang) S (Sedang), R (Rendah), SR (Sangat Rendah), T (Tinggi)

7 Basa-basa yang dapat dipertukarkan, KTK, kejenuhan basa dan pH tanah saling berhubungan, Basa-basa yang dapat dipertukarkan adalah total kation-kation basa dari ion (Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>) sedangkan kejenuhan basa adalah jumlah basa-basa tersebut per kapasitas tukar kation tanah dan dinyatakan dalam satuan persen. Jika kejenuhan basa tinggi maka pH tanah tinggi karena jika kejenuhan basa rendah berarti banyak terdapat kation-kation masam yang terjerap kuat di koloid tanah.

Pada daerah yang memiliki curah hujan tinggi, koloid tanah akan lebih banyak didominasi oleh ion H<sup>+</sup>, sedangkan kation-kation basa terjerap lemah dan berada pada larutan bebas (Hakim dkk, 1986), tingginya curah hujan mengakibatkan kandungan basa-basa yang dapat dipertukarkan semakin rendah karena proses pencucian berjalan intensif, Pada lahan yang sering terbuka, seperti pada lahan-lahan revegetasi yang belum mempunyai penutupan tajuk juga akan menambah pemicu terjadinya leaching, hal ini akan dapat menyebabkan penurunan kandungan kation basa dalam tanah.

Berdasarkan hasil analisis sampel tanah di Laboratorium Tanah Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Unmul Samarinda seperti yang disajikan pada tabel 6 dan 7 nilai basa-basa dapat dipertukarkan (Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>) pada lahan original pra tambang dan lahan revegetasi pasca tambang keseluruhan tergolong rendah sampai sangat rendah, Ca<sup>2+</sup> (1,29-0,32 meq/100 gr), Mg<sup>2+</sup> (0,85-

0,03 meq/100 gr), K<sup>+</sup> (0,16-0,07 meq/100 gr), Na<sup>+</sup> (0,02-0,00), kecuali nilai Mg<sup>2+</sup> pada kedalaman 30-60 cm tegolong sedang dengan nilai (1,89 meq/100 gr), diperkirakan nilai inilah yang memicu kenaik kejenuhan basa hingga tergolong tinggi dengan nilai (63,57 %)

Adapun kapasitas tukar kation (KTK) pada lahan original pra tambang dan lahan revegetasi pasca tambang baik pada kedalaman 0-30 maupun 30-60 cm menurut Petunjuk Teknis Evaluasi Kesuburan Tanah dari Balitanah Bogor (2005) tergolong rendah sampai sangat rendah (9,58-3,04 meq/100 gr).

Untuk kejenuhan basa pada lahan original pra tambang dan lahan revegetasi pasca tambang baik pada kedalaman 0-30 maupun 30-60 cm menurut Petunjuk Teknis Evaluasi Kesuburan Tanah dari Balitanah Bogor (2005) keseluruhannya tergolong sangat rendah (14,15-2,08 %) terkecuali pada Blok 12 yang tergolong rendah (22,06 %) pada kedalaman 30-60 cm dan tergolong tinggi (63,57 %) pada kedalaman 30-60 cm kecuali ini dapat dipicu dengan nilai Mg<sup>2+</sup> pada kedalaman 30-60 cm tegolong sedang dengan nilai (1,89 meq/100 gr).

Kondisi sifat kimia basa-basa dapat ditukar (Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>) diatas sejalan dengan pendapat beberapa pakar dan pada daerah penelitian di Kabupaten Kutai Barat termasuk dalam kategori iklim tropika humida dengan rata-rata curah hujan yang tinggi sehingga proses pencucian berjalan intensif menyebabkan basa-basa yang dapat dipertukarkan tergolong rendah hingga sangat rendah

baik pada lahan original pra tambang maupun pada lahan revegetasi pasca tambang, kecuali pada Blok 12 lahan revegetasi pasca tambang hanya nilai Mg yang tergolong sedang, diperkirakan itu mampu memicu kejemuhan basa hingga tergolong tinggi sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman jenis Jabon (*Anthocephalus cadamba*) lebih baik dibandingkan pada Blok 03 yang mempunyai nilai kejemuhan basa yang sangat rendah.

Kapasitas tukar kation tanah didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk menyerap dan mempertukarkan kation, Kation-kation yang berbeda dapat mempunyai kemampuan yang berbeda untuk menukar kation yang dijerap, Kapasitas tukar kation merupakan sifat kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah, KTK pada lokasi penelitian tergolong sangat rendah, ini menunjukkan bahwa tanahnya tidak mampu menyerap dan menyediakan unsur

hara diduga karena unsur-unsur hara tersebut hilang tercuci oleh air.

Jika melihat dari data analisis karakteristik sifat kimia tanah yang telah didapatkan diatas baik pada lahan original pra tambang dan lahan revegetasi pasca tambang, dari keseluruhan hanya nilai  $Mg^{2+}$  dan Kejemuhan Basa pada lahan revegetasi pasca tambang di blok 12 yang kondisinya terbaik untuk tanaman menurut Balitanah Bogor (2005), Akan tetapi nilai sifat kimia tanah pada daerah penelitian didominasi oleh kondisi yang ekstrem bagi tanaman sehingga peneliti berpendapat jenis tanaman Jabon (*Anthocephalus cadamba*) toleran terhadap sifat-sifat kimia tanah yang ekstrem.

#### Tekstur

Pengolahan dari data tekstur yang telah didapatkan dilapangan menghasilkan nilai seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Perbandingan Nilai Tekstur, Tinggi dan Diameter Antara Lahan Revegetasi

No	Lapangan		Penyebaran Partikel			Tekstur	Tinggi	Diameter	Keterangan Pertumbuhan
	Kode	Interval (cm)	Silt	Clay	Total Sand				
1	BL05SB1 (PT P.3000)	0-30	21.90	24.60	53.50	SCL			Tidak Normal
2		30-60	30.10	25.80	44.10	Loam			
3	BL03SB1 (PT P.6800)	0-30	29.80	30.00	40.20	CL	2.70	4.77	Tidak Normal
4		30-60	32.40	28.40	39.20	CL			
5	BL12SB1 (PT P.4500)	0-30	15.50	30.00	54.50	SCL	13.56	22.29	Normal
6		30-60	13.40	28.10	58.50	SCL			

Keterangan : PT (Lahan Revegetasi Pasca Tambang), Silt (Debu), Clay (Liat), Sand (Pasir), CL (Lempung Berlat), Loam (Lempung)

Tabel 8. Perbandingan Nilai Tekstur Antara Lahan Original

No	Lapangan		Penyebaran Partikel			Tekstur
	Kode	Interval (cm)	Silt	Clay	Total Sand	
1	BL33SB2 (OR P.3000)	0-30	29.80	24.00	46.20	Loam
2		30-60	17.90	29.10	53.00	
3	BL05SB1 (OR P.3000)	0-30	35.70	30.10	34.20	CL
4		30-60	36.50	38.40	25.10	
5	BL03SB1 (OR P.6800)	0-30	58.70	30.10	11.20	SiCL
6		30-60	50.10	34.00	15.90	
7	BL14SB2 (OR P.7000)	0-30	36.70	33.30	30.00	CL
8		30-60	33.10	41.60	25.30	
9	BL14SB2 (OR P.3000)	0-30	24.90	16.50	58.60	SL
10		30-60	36.50	13.10	50.40	
11	BL18SB2 (OR)	0-30	27.00	10.30	62.70	SL
12		30-60	19.70	8.50	71.80	
13	BL35SB2 (OR)	0-30	6.70	35.40	57.90	SC
14		30-60	6.90	25.20	67.90	

Keterangan : OR (Original/Lahan original Pra Tambang), Silt (Debu), Clay (Liat), Sand (Pasir), CL (Lempung Berliat), Loam (Lempung), SCL (Lempung Liat Berpasir), SL (Pasir Berlempung)

47) dasarkan hasil analisis sampel tanah di Laboratorium Tanah Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropika Humida Universitas 5) Mulawarman Samarinda seperti yang disajikan pada tabel 8 dan 9 hasil analisis tekstur tanah pada lahan revegetasi pasca tambang dan lahan original pra tambang baik pada kedalaman 0-30 maupun 30-60 cm menurut Petunjuk Teknis Evaluasi Kesuburan Tanah dari Balitanah Bogor (2005) yang mengacu pada soil taxonomy, USDA (Soil Survey Staff, 1990) menunjukkan bahwa tanah daerah penelitian didominasi tekstur lempung berliat (clay loamy) dan lempung liat berpasir (sandy clay Loam), Meski kandungan lempung berliat yang tinggi tetapi nilai kapasitas tukar kation (KTK) tergolong rendah sampai sangat rendah, diperkirakan hal ini desebabkan oleh tanah tua jenis (Ultisol) pada daerah penelitian yang telah mengalami pencucian yang lama akibat curah hujan yang tinggi sehingga ketersediaan mineral basanya menipis.

1

Dikareanakan kapasitas tukar kation tanah didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk 1) menyerap dan mempertukarkan kation, Kation-kation yang berbeda dapat mempunyai kemampuan yang berbeda untuk menukar kation yang dijerap, Kapasitas tukar kation merupakan sifat kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah, KTK pada lokasi penelitian tergolong rendah hingga sangat rendah, ini menunjukkan bahwa tanahnya tidak mampu menyerap dan menyediakan unsur hara diduga karena unsur-unsur hara tersebut hilang tercuci oleh air.

#### 14 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1)

Karakteristik sifat kimia tanah pada lahan original pra tambang dilokasi penelitian pada umumnya mempunyai nilai pH yang sangat rendah berkisar antara (4,12-3,71 H<sub>2</sub>O), C-organik sedang hingga sangat rendah berkisar antara (10 2-0,22 %), nitrogen rendah hingga sangat rendah berkisar antara (0,18-0,05 %), fosfor sangat rendah berkisar antara (10 4,27-0,22 ppm), kalium rendah hingga sangat rendah berkisar 10 ara (0,15-0,07 meq/100 gr), natrium sangat rendah berkisar antara (0,02-0,01 meq/100 gr), magnesium rendah hingga sangat rendah berkisar 10 ara (0,25-0,03 meq/100 gr), kalsium sangat rendah berkisar antara (0,14-0,04 meq/100 gr), kapasitas tukar kation sangat rendah berkisar antara (9,96-3,04 meq/100 gr), kejenuhan basa sangat rendah berkisar antara (8,11-2,08 %) dan kejenuhan aluminium yang tinggi hingga sangat tinggi berkisar antar (56,59-72,26 %). Berdasarkan data yang didapatkan menurut peneliti tanaman jenis Jabon (*Anthocephalus cadamba*) toleran dan dapat hidup terhadap karakteristik sifat kimia diatas tapi tidak dengan kejatuhan basa yang sangat rendah. 2) Adapun sifat kimia tanah pada lahan revegetasi pasca tambang dilokasi penelitian baik pada tanaman yang mengalami ketidaknormalan pertumbuhan dan yang pertumbuhannya normal tidak memiliki perbedaan yang signifikan kecuali magnesium yang mempunyai nilai tergolong sedang dan kejenuhan basa mempunyai nilai yang tergolong tinggi pada tanaman yang pertumbuhannya normal, berikut rinciannya nilai pH berkisar antara (4,09-4,53 H<sub>2</sub>O), C-organik berkisar antara (0,44-1,27 %), nitrogen berkisar antara (0,08-0,10 %), fosfor berkisar antara (0,22-2,50 ppm), kalium berkisar antara (0,11-0,15 meq/100 gr), natrium berkisar antara (0,00-0,02 meq/100 gr), magnesium

berkisar antara (0,15-1,89 meq/100 gr), kalsium berkisar antara (0,05-1,29 meq/100 gr), KTK berkisar antara (4,50-6,12 meq/100 gr), dan kejenuhan aluminium berkisar antara (23,76-76,83).

3) Sehingga penyebab utama dari ketidaknormalan pada lahan revegetasi pasca tambang untuk jenis pohon Jabon (*Anthocephalus cadamba*) di Blok 05 dan khususnya diBlok 03 terkait dengan sifat kimia tanahnya adalah sangat rendahnya kejenuhan basa adapun faktor lain yang sangat berpengaruh menurut peneliti adalah bentuk lereng yang relatif datar dengan tekstur yang tegolong liat berlempung (clay loam) sehingga dapat menyebabkan air mengendap membuat akar membusuk.

# ANALISIS KARAKTERISTIK SIFAT KIMIA TANAH PADA LAHAN ORIGINAL PRA TAMBANG DAN LAHAN REVEGETASI PASCA TAMBANG BATU BARA DI PT TRUBAINDO COAL MINING KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

ORIGINALITY REPORT

---

25%

SIMILARITY INDEX

---

PRIMARY SOURCES

---

- |          |   |                |
|----------|---|----------------|
| 1        | <a href="http://es.slideshare.net">es.slideshare.net</a>  | 128 words — 2% |
| Internet |   |                |
| 2        | <a href="http://monica-ria-felicia.blogspot.com">monica-ria-felicia.blogspot.com</a>  | 90 words — 1%  |
| Internet |   |                |
| 3        | Jesyca Suriana, Hery Sutejo, Marisi Napitupulu.<br>"PENGARUH PUPUK KANDANG AYAM DAN PUPUK<br>NPK PELANGI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL<br>TANAMAN TOMAT CHERRY ( <i>Solanum lycopersicum L.</i> )",<br>AGRIFOR, 2019 | 87 words — 1%  |
| Crossref |   |                |
| 4        | <a href="http://www.vsspbab.cz">www.vsspbab.cz</a>  | 84 words — 1%  |
| Internet |   |                |
| 5        | <a href="http://repository.ipb.ac.id">repository.ipb.ac.id</a>  | 83 words — 1%  |
| Internet |   |                |
| 6        | <a href="http://susiramadhaniblog.wordpress.com">susiramadhaniblog.wordpress.com</a>  | 81 words — 1%  |
| Internet |   |                |
| 7        | <a href="http://portaluqb.ac.id:808">portaluqb.ac.id:808</a>  | 70 words — 1%  |
| Internet |   |                |

- 8 Ermal Subhan, Salampak Salampak, Andrie Elia Embang, Maslian Maslian. "Analisis Tingkat Kesuburan Tanah Lahan Bekas Penambangan Batubara PT. Senamas Energindo Mineral Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah", Media Ilmiah Teknik Lingkungan, 2019  
Crossref 63 words — 1 %
- 9 download.garuda.ristekdikti.go.id Internet 54 words — 1 %
- 10 jurnal.untan.ac.id Internet 54 words — 1 %
- 11 anyflip.com Internet 50 words — 1 %
- 12 1library.net Internet 43 words — 1 %
- 13 ojs3.unpatti.ac.id Internet 43 words — 1 %
- 14 etheses.uin-malang.ac.id Internet 32 words — 1 %
- 15 proceedings.unisba.ac.id Internet 31 words — < 1 %
- 16 sendawar.com Internet 31 words — < 1 %
- 17 jurnalsolum.faperta.unand.ac.id Internet 30 words — < 1 %
- 18 Floryanus Kerung, Zuhdi Yahya, Zikri Azham. "The study of business development rubber plant 29 words — < 1 %

people in the village Long Hubung districts Long Hubung  
district Mahakam Ulu", AGRIFOR, 2018

Crossref

19	journal.unhas.ac.id Internet	28 words – < 1 %
20	repository.unipa.ac.id:8080 Internet	27 words – < 1 %
21	www.obecspy.cz Internet	27 words – < 1 %
22	worldwidescience.org Internet	26 words – < 1 %
23	a-research.upi.edu Internet	25 words – < 1 %
24	eprints.upnyk.ac.id Internet	23 words – < 1 %
25	jurnal.fp.umi.ac.id Internet	22 words – < 1 %
26	talenta.usu.ac.id Internet	19 words – < 1 %
27	pt.scribd.com Internet	16 words – < 1 %
28	repository.unsri.ac.id Internet	16 words – < 1 %
29	Batseba Alfonsina Suripatty. "Hubungan Pertumbuhan Varietas Sagu (Metroxylon sago	14 words – < 1 %

Rottb) dengan Faktor Lingkungan di Desa Seget Papua Barat",  
JURNAL BUDIDAYA PERTANIAN, 2018

Crossref

- 30 Riduan Riduan, Junaidi Junaidi, Rita Hayati. "STUDI SIFAT FISIK TANAH PADA KEBUN KARET DAN KELAPA SAWIT DI DESA RASAN KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK", Perkebunan dan Lahan Tropika, 2021  
Crossref
- 31 jurnal.upnyk.ac.id Internet 13 words – < 1 %
- 32 Riski Akbar, Rachmat Zainuddin. "PEMETAAN SIFAT KIMIA TANAH PADA BEBERAPA PENGGUNAAN LAHAN DI DESA BOYANTONGO KECAMATAN PARIGI SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG", AGROTEKBIS : E-JURNAL ILMU PERTANIAN, 2023  
Crossref
- 33 jurnal.untad.ac.id Internet 12 words – < 1 %
- 34 Sudirman Almi, Noor Jannah. "Effect of Types and Doses of Compost Fertilizer on Growth and Yield of Sawi Plants (*Brassica juncea* L.)", AGRIFOR, 2019  
Crossref
- 35 ejournal.unsrat.ac.id Internet 11 words – < 1 %
- 36 www.eprints.upnyk.ac.id Internet 11 words – < 1 %
- 37 asmaaulkhusna.blogspot.com Internet 10 words – < 1 %
- repository.unibos.ac.id

- 39 Emiliana Lidya, Abdul Rahmi. "PENGARUH PUPUK KOMPOS DAN PUPUK ORGANIK CAIR NASA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MENTIMUN (*Cucumis sativus L.*) VARIETAS MISANO F1", AGRIFOR, 2019

Crossref

- 40 Febi Regita Ardia Pramesti, Urai Suci Yulies Vitri Indrawati, Sulakhudin Sulakhudin. "PENGARUH PEMBERIAN BIOCHAR TANKOS DAN BIOCHAR KOTORAN AYAM TERHADAP KETERSEDIAAN UNSUR HARA NPK DAN PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG MANIS (*Zea mays L.* Saccharata Sturt) DI TANAH ALUVIAL", Jurnal Sains Pertanian Equator, 2024

Crossref

- 41 Helilinawati Helilinawati, Hery Sutejo, Abdul Fatah. "Effect of Urea and SP-36 on the Growth of Grafted Rubber Seedling (*Hevea brasiliensis* Muell.Arg.) Clone PB 260", AGRIFOR, 2019

Crossref

- 42 Romando Lumbanraja, Jamalam Lumbanraja, Hery Norvpriansyah, Muhajir Utomo. "Perilaku Pertukaran Kalium (K) dalam Tanah, K Terangkut serta Produksi Jagung (*Zea mays L.*) Akibat Olah Tanah dan Pemupukan di Tanah Ultisol Gedung Meneng pada Musim Tanam Ketiga", Journal of Tropical Upland Resources (J. Trop. Upland Res.), 2020

Crossref

- 43 belajar.ditpsmk.net  
Internet

9 words – &lt; 1 %

- 44 journal.univetbantara.ac.id

9 words – &lt; 1%

- 45 Gribaldi Gribaldi, Nurlaili Nurlaili, Iqbal Effendy. "Pengaturan Waktu Panen dan Pemupukan Nitrogen Tanaman Utama Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Ratun Padi pada Lahan Pasang Surut", AGROSAINSTEK: Jurnal Ilmu dan Teknologi Pertanian, 2020

Crossref

- 46 Ismail Bakrie, Heroden Setiawan, Zikri Azham. "PERAN SERTA MASYARAKAT KELURAHAN KARANG BALIKPAPAN UTARA DALAM USAHA-USAHA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN", AGRIFOR, 2019

Crossref

- 47 Nova Iswanto, Puji Astuti. "The influence of Cow Manure and Liquid Organic fertilizer Super Natural Nutrition toward growth and yield of land cress (*Ipomoea reptans* Poir)", AGRIFOR, 2019

Crossref

- 48 [apps.worldagroforestry.org](http://apps.worldagroforestry.org)  
Internet

8 words – &lt; 1%

- 49 [edoc.site](http://edoc.site)  
Internet

8 words – &lt; 1%

- 50 [eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)  
Internet

8 words – &lt; 1%

- 51 [pdfs.semanticscholar.org](http://pdfs.semanticscholar.org)  
Internet

8 words – &lt; 1%

- 52 [www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)  
Internet

8 words – &lt; 1%

---

53 www.jlsuboptimal.unsri.ac.id 8 words – < 1%

Internet

54 Sambrano, J.R.. "Electronic and structural properties of the (001) SrZrO"3 surface", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 20070701 7 words – < 1%

Crossref

55 www.mitraryiset.com 6 words – < 1%

Internet

---

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF